

inter carneam membranam & cutem repens, sobolesq; tenuissimas diffundens. Huic furculo pollicis exporrecto interdum ramuli accedunt, permiscunturq; ab ijs secundi nervi propaginibus, quas modò internæ summæ manus cutem adire scribam. ^k Humilior enim crassiorq; ramus eius secundi nervi diuisionis, quæ iuxta cubiti flexum perficitur, statim in duas quoque dirimitur propagines, sub ^l media prorepentes uena ab humerali ad communis uenæ constitutionem proficiscente. ^m Vna harum propaginum quam elatiorem appellare nihil prohibet, postquam dictæ iam uenæ succumbens, ad ⁿ uenæ communis usque originem obliquo ductu accessit, relicta uena cuti subtenitur, & in descensu elatius ad radij sedem nonnihil oblique condescens, secundum internum latus ^o musculi oblongi & radio proprij ad brachialis usque radicem perfertur. ^p Altera propago, quam memoriæ doctrinæq; gratia in scholis humiliorem nuncupo, magis oblique quàm medium cubiti flexus aut uenæ communis origo consistat, deorsum fertur, ac tandem uenæ maioris cubiti sedis cuti potissimum oblata attenuata, ad brachiale usque ^q prorepat, in multos exiles furculos in progressu absumpta. Nam priusquam longo ductu in cubiti regionem feratur, in duos præcipuos partitur ramos, quorum ^r unus quodammodo radij regioni exporrigitur, ^s alter uerò ulnæ, ac uterque crebrò brachiale superat, ramulos in cutem internæ summæ manus sedi dispargens. Dein ab illis ramulis qui Veneris monticulum conscendunt, interdum soboles in externam manus sedem excurrunt, neruulis ^t commiscendæ cutem primi pollicis internodij externæ regioni obductam implicantibus, atque in hunc modum secundus absumitur neruus. Tertius autem neruus simulatque secundi nervi ^u propaginem adaugetur, frequenter ^v ramulum in cutem dispensat, anteriori brachij sedi hinc obnatam. Hinc uti ab initio in alto repositus, cubiti flexum accedit, æquali propemodù intervallo in progressu à secundo distans, ac internam sedem sibi uendicans. Tertius enim neruus nò adambulans per mediam cubiti flexus sedem in cubitum delabitur: uerum anteriori sedi insidet ^y tuberculi interioris humeri, ac super internum latus quodammodo uehitur insertionis ^z musculi cubiti flexuentium posterioris. Quum uerò hanc transcendit insertionem, in multas ^a dirimitur propagines, seriatim tunc recensendas, ubi ^b quintum neruum ad cubitum usque sermone serie deduxero, qui unà cum tertio in musculos digeritur, sedem cubiti interiori occupantes. Quartus neruus à reticulari illo neruorum iuxta uertebra latera implexu principium quoque ducens, omnium neruorum qui in brachiū porriguntur longè crassissimus est, & similiter atq; tertius occultatus cum ipso in brachium properat, axillari uenæ & magnæ manus arteriæ attensus, moxq; ^c insignes utrunque soboles ^d musculis distribuens, quorum ministerio cubitum extendimus. Priusquam uerò præfens neruus ad medium usque longitudinis brachij pertingat, oblique retrorsum ^e ad humeri os contorquetur, hoc & musculos cubitum extendentes intercedens. Verum anteaq; penitus reflectatur, ab interno ipsius latere ^f propaginem emittit, quæ ^g inter musculos cubitum extendentes & posteriorem cubitum flexuentium in internam brachij sedem procidit, uniuersa in huius sedis cutem absumenda, furculosq; partim sursum partim deorsum multiplici serie sparsura. Porro ipse quartus nervi truncus, ad eum modum secundum humeri posteriora reflexus, sensim ad externam brachij sedem properat, ac ab externo latere ^h propaginem edit, quæ ⁱ inter anteriorem cubitum extendentium musculum & caput oblongi musculi radium in pronum ducentis ex alto emergens, in cutem dispensatur externæ brachij & cubiti articuli sedi obductam. Quum primum autem quartus neruus in alto semper latitans, ^m exterius humeri contingit tuberculum, posteriori ipsius sedi innititur, in qua huius nervi nomine ⁿ sinum à Natura priuatim exculptum diximus, quò neruus musculis occultatus, atque hinc in frequentem sobolem spargendus, turò ueheretur. Mox enim atque neruus ille in cubitum ducitur, ^o ramum promit, qui ex alto emergens, errabundo ductu sub cute ad brachiale usque prorepat, frequentes furculos in progressu educens, à quibus cutis externam cubiti sedem obtegens intertextitur. Deinde quartus neruus in duos ^p discinditur truncos, in profundo, ut & ipsorum radix, reconditos. Horum ^q alter altero elatior est, ac radio exporrigitur: ^r alter autem qui humilius consistit, secundum ulnam deorsum fertur. Elatior penitus in ter superius latus musculi bifido tendine brachiale extendentis, & exterius inferius ue latus musculi longi radium in pronum ducentis ad brachiale tendit, in progressu faciles ramulos utriusq; quibus attenditur occultaturq; musculis comunicans. Vbi uerò elatior hic ramus brachiale accedit, per ^s transuersum properat ligamentum, in externa radij sede bifido tendine brachialis extendenti obductum. Cæterum mox atque præfens quarti nervi ramus externam brachialis sedem cōtingit, in duas dirimitur propagines, quarum altera duplici furculo externæ pollicis regioni offertur, altera uerò in duas secta soboles, unam indici porrigit in ipsius externam sedem duplici quoque furculo absumendam. alteram autem medio largitur digito, eam simpli

Tertij nervi
ad cubiti usque
flexum pro-
gressus.

Quartij nervi
in brachium
ingressus, ip-
siusq; series.

simplicem in diuisamq; interno lateri exterioris sedis quarti nervi iam cubitum ingredientis in duos ramos ¹ frequentes educit soboles, ac primam donat capiti ² extendentis, secundam capiti ³ musculi cuius auxilio offert ⁴ musculo brachiale simplici tendine extendenti. præfens ramus ⁵ tribus musculorum principijs ab ulna bet. ac eorum quidem principiorum primus musculi breuior uisitur: mox ille qui triplicem diffundit tendine licet os sustinenti innectit, secundum primo pollicis ⁶ tio. Dein musculus, qui tribus pollicis ossibus insertus ducit. Mox musculus, cuius beneficio index, ac interdu oblique aguntur. Horum namque musculorum primi præfenti quarti nervi ramo soboles offeruntur, accuratè obseruantes, qui oblique ab ulna uersus radium pertin ⁷ brachiale non conscendit, multoq; minus in minore ad brachialis radicem cessat, aliquot furculis brachialis sanè modum quartus neruus in ramos spargitur. Por ⁸ sepius nobis plexu inferius quàm quatuor hætenus d ⁹ artensus per axillam in brachium fertur, nullas omnin ¹⁰ buens. Nam indiuisus ¹¹ inter musculos cubitum exten ¹² posteriorem secundum internam brachij sedem occultat ¹³ humeri contingat tuberculum, ad cuius posteriorem ¹⁴ sinum, quo aptè in cubitum uehitur. Quemadmodum ¹⁵ tuberculi sedem occupare dictus est, ita sanè & quintus h ¹⁶ li consistit, pariq; quodammodo serie cum tertio diger ¹⁷ uis ¹⁸ propagines omnibus offeruntur musculis internar ¹⁹ interiori tuberculo humeri, & ab ipsa ulna radioq; prin ²⁰ neruo potissimum soboles sparguntur in ²¹ musculum ²² flexentem, & ²³ illum qui tertios eorumdem digitorum ²⁴ pollicis ossis flexus est autor. deinde propago quoque ²⁵ qui ab interno humeri prodians tuberculo, ac postbra ²⁶ chialis flexus opifex habetur. Verum is musculus etiam ²⁷ scit, ut & omnes ab interno humeri tuberculo pronati ²⁸ moratum ²⁹ is censetur, qui tēdine lato summæ manus in ³⁰ to brachialis ossi insertus brachiale flecit, mox ³¹ qui r ³² describitur. Porro quintus & tertius nervi etiam si spari ³³ penitus hic non absumuntur, uerum utrorumque singu ³⁴ & in plures furculos diffundendi. Ac tertij quidem ner ³⁵ gitorum secundos flecentem articulos, & illum qui ter ³⁶ tur, unà cum ³⁷ uena ac arteria hæc deductis ad brachiale ³⁸ ligamentum in brachialis interna sede tendinibus obdu ³⁹ sed nimis quàm obscuros, quibusdā musculis exhibere ⁴⁰ digitorum motibus quoque præfunt. cuiusmodi ⁴¹ is est ⁴² tur, dein ⁴³ quo pollex indici proximè adigitur, & ⁴⁴ duo ⁴⁵ tres secundi ipsius internodij flexus opifex, mox ⁴⁶ qui ⁴⁷ ac ⁴⁸ duo qui indicis primum flecent articulum, ac inte ⁴⁹ flecentium. Verum his musculis, ut & ⁵⁰ illi qui radium ⁵¹ uipotius attenduntur, quàm inserantur, aut etiam sup ⁵² tertij nervi ramus in uola tres notatu dignas & insignes ⁵³ prima pollicis internam accedit sedem, in duos prius di ⁵⁴ culis internæ indicis sedi implicatur, tertia uerò simplex ⁵⁵ digiti sedi exporrigitur. Porro quinti nervi ⁵⁶ ramus ul ⁵⁷ quatuor digitorum articulos flecentem, & illum qui ⁵⁸ flecit, ad brachiale ducitur, ⁵⁹ uena etiam & arteria cōcor ⁶⁰ ad uolam per transuersum brachialis ligamentū tendunt ⁶¹ id superauit, unam propaginē in duos diuisam furculos ⁶² ac unam similiter in duos furculos diremptam internæ